

حیوانات کے امراض کیلئے

کیوریتو میو پیٹھک ادویات



مرقیت

بیاختر

موتھ

کیوریتو ویٹرنری (پرائیویٹ) لمیٹڈ



CURATIVE

Tel. Sales: 047-6214576, Head Off: 047-6005255
Fax: 047-6212299

فہرست ادویات

(A) دودھل جانوروں کیلئے ادویات

سری نمبر	نام ادویات	پیکنگ	مقدار دوا	قیمت
11	گل گھوٹوروک	پیکٹ	10 گرام	20.00
11	اکسیر منہ گھر	پیکٹ	8 گرام	15.00
11	منہ گھر روک	پیکٹ	10 گرام	20.00

(E) جلدی امراض کیلئے ادویات

12	اکسیر جلد (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
12	اکسیر شپری (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
4	ایٹھنی سپیک اسٹیمینٹ	ڈبی	20 گرام	30.00
12	اکسیر ٹنگرین (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00

(F) متفرق امراض کیلئے ادویات

13	کیورٹیو (اکسیر بخار)	پیکٹ	8 گرام	15.00
13	اکسیر رنگ کپسولز	کپسولز	12 کپسولز	75.00
14	اکسیر چشم	پیکٹ	8 گرام	10.00
14	اکسیر چوٹ (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
14	اکسیر درد کپسولز	کپسولز	12 کپسولز	75.00
14	اکسیر سران کپسولز	کپسولز	20 کپسولز	100.00
14	اکسیر فاج (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
15	اکسیر کرم (لے دلوک)	30 گرام ہاؤس	120ML	100.00
15	اکسیر کھانسی	پیکٹ	8 گرام	15.00
15	اکسیر گرمی	پیکٹ	8 گرام	15.00
16	اکسیر نمونیہ و زکام	پیکٹ	8 گرام	15.00
13	تریان زہر باد کپسولز	کپسولز	کپسولز	75.00
13	ٹاکس گرینولز	پیکٹ	100 گرام	100.00
15	اکسیر حراج	پیکٹ	8 گرام	15.00

(G) گھوڑوں کی امراض کیلئے ادویات

16	اکسیر آب گیر	پیکٹ	10 گرام	20.00
16	اکسیر کنار (منفس)	پیکٹ	10 گرام	20.00
16	اکسیر عذا	پیکٹ	10 گرام	20.00

(H) جانوروں کی صحت اور دیکھ بھال کیلئے ہدایات

(صفحہ نمبر 17 تا 19)

سری نمبر	نام ادویات	پیکنگ	مقدار دوا	قیمت
4	اکسیر پستان	پیکٹ	8 گرام	15.00
4	اکسیر خرابی دودھ (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
4	اکسیر دودھ گرینولز	پیکٹ	100 گرام	100.00
4	اکسیر سوزش پستان (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
5	اکسیر کریک پستان	پیکٹ	8 گرام	15.00
5	کیورٹیو آئل	ڈراپر	30ML	30.00
5	اکسیر فلی پستان کپسولز	کپسولز	40 کپسولز	
5	اکسیر ملک فیلر	پیکٹ	8 گرام	15.00

(B) امراض افزائش نسل کیلئے

6	اکسیر پروسٹ	پیکٹ	8 گرام	15.00
6	اکسیر سہیل ولادت	پیکٹ	8 گرام	15.00
7	اکسیر جگر گرینولز	پیکٹ	50 گرام	15.00
7	اکسیر حمل (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
7	اکسیر رحم (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
8	اکسیر نفاس	پیکٹ	8 گرام	15.00

(C) نظام ہضم کے امراض کیلئے ادویات

8	اکسیر اچھارہ	پیکٹ	8 گرام	15.00
8	اکسیر ہشش (قوچ)	پیکٹ	6 گرام	15.00
8	اکسیر خونی تپش	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر رت و ہادی	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر گھدی چھوڑ	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر مٹی چھوڑ (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
9	اکسیر واہ کپسولز	کپسولز	12 کپسولز	75.00
10	واہ روک	پیکٹ	10 گرام	20.00
10	اکسیر ہضم گرینولز	پیکٹ	100 گرام	100.00

(D) مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات

10	اکسیر اعظم	پیکٹ	8 گرام	15.00
10	اکسیر سرگن کپسولز	کپسولز	30 کپسولز	120.00
11	اکسیر گل گھوٹو	پیکٹ	8 گرام	15.00

حیوانات کے امراض کیلئے ”کیوریٹو“ ہومیوپیتھک ادویات

ہومیوپیتھی کی روز افزوں ترقی اور عوام و خواص میں اس کی انتہائی مقبولیت اب صرف انسانی علاج معالجے کی حد تک محدود نہیں رہی۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں (Homoeopathy in Veterinary Practice) یعنی ”ہومیوپیتھک ادویات سے حیوانات کا علاج“ کا مضمون بہت ایڈوانس ہو چکا ہے۔

پاکستان میں کیوریٹو میڈیسن کمپنی 1961ء سے حیوانات کی امراض کیلئے بفضلہ تعالیٰ مفید ہومیوپیتھک مرکبات مارکیٹ میں پیش کر رہی ہے۔ یہ ادویات:-

- 1- فوری اثر ہیں اور مرض کی مکمل بیخ کنی کرتی ہیں۔
 - 2- تجویز کرنا عام آدمی کیلئے بھی بہت آسان ہے۔ کیونکہ تشخیص کیلئے عام فہم علامات لکھ دی گئیں ہیں
 - 3- بد اثرات (Side Effects) سے پاک ہیں۔ دیگر ادویات کے برعکس ان ادویات سے جانور اور اس کے دودھ، گوشت اور انڈوں پر کوئی مضر اثر نہیں پڑتا
 - 4- کھلانی بہت آسان ہیں۔ روٹی یا آٹے میں لپیٹ کر جانور یا دیہے ہی جانور کے منہ میں ڈال دیں۔
 - 5- دیگر طریقہ ہائے علاج کی نسبت سستی ہیں۔
 - 6- رسالہ میں درج ادویات کے علاوہ بھی مختلف امراض کے نسخہ جات موجود ہیں اگر کوئی بیماری مندرجہ بیماریوں کے علاوہ بھی ہو اور اس مرض کیلئے آپ دوا حاصل کرنا چاہیں تو ہیڈ آفس رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ دوا آپ کو خطہ صائبوا کر بھجوا دی جائے گی۔
- ترکیب استعمال:

ہر دوا کے ساتھ ترکیب استعمال درج ہے مرض کی شدت اور نوعیت کے مطابق دو گلانے کا درمیانی وقفہ حسب ضرورت کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز اگر کسی جانور میں ایک سے زیادہ بیماریوں کی علامت موجود ہوں تو ان بیماریوں کی ادویات اکٹھی استعمال کروائی جاسکتی ہیں۔ چھوٹے جانوروں مثلاً کٹوں، چھڑوں اور بھیڑ بکری کو دوائی کی آدھی مقدار (یعنی آدھا پیکٹ یا ایک کپسول فی خوراک) استعمال کروائیں۔

(A)۔ دودھل جانوروں کیلئے ادویات

TREATMENT OF UDDERS AND TEATS

اینٹی سپٹک آئینٹمنٹ

تھنوں اور حیوانہ پر لگانے کا مرہم
An antiseptic ointment for teats.

چوٹ، موسم کی شدت اور دیگر وجوہات سے تھنوں اور حیوانہ کے پھٹنے اور پیدا شدہ زخموں وغیرہ پر لگانے کی مفید دوا ہے۔ جو زخم کو انفیکشن سے بچا کر تھنوں اور حیوانہ کو صحت مندر رکھتی ہے۔ حسب ضرورت صبح دوپہر شام لگائیں۔

اکسیر پستان

تھنوں اور حیوانہ کی نشوونما کیلئے
For undeveloped or retarded udders and teats

بعض جانوروں کے پستان اور حیوانہ پوری نشوونما نہیں پاتے اور ان میں دودھ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات ہارمونز کی کمی خوراک کی کمی اور موروثی (نسلی) اسباب ہیں۔ نیز بعض جانوروں میں کسی بیماری کے بعد تھن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور دودھ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے جانوروں کو "اکسیر پستان" ہر دوسرے دن ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً دس بارہ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دودھ کی کمی پوری کرنے کیلئے روزانہ "اکسیر دودھ گریٹولز" کھلائیں۔

اکسیر خرابی دودھ

دودھ کی خرابی کیلئے
For abnormality of milk

دودھ میں مہٹکیاں، خون کی آمیزش اور رنگ یا ذائقہ کی تبدیلی وغیرہ دراصل تھنوں یا حیوانہ پر چوٹ لگنے یا جراثیم کی انفیکشن کی علامت ہے۔ وقت پر دودھ نہ دوسنے اور گندگی سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں "اکسیر خرابی دودھ" حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے نمبر وار ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ اگر تھنوں یا حیوانہ پر سوزش بھی ہو تو "اکسیر خرابی دودھ" کے ہر پیکٹ کے ساتھ نمبر وار ایک ایک پیکٹ "اکسیر سوزش پستان" بھی کھلائیں۔ مناسب ہے کہ مرض کی مکمل تیج کنی کیلئے ایک ڈبی "اکسیر گٹنی پستان کپسولز" بھی استعمال کروادیں۔ خراب دودھ کو دوسٹے وقت لازماً تھنوں سے نکال دینا چاہیے۔ نیز تھنوں کی صفائی کا خیال بھی رکھیں۔

اکسیر دودھ گریٹولز

کم دودھ کیلئے
For decrease in milk production

دودھ کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں مثلاً موروثی (نسلی) اسباب، سونے کے بعد میلانہ پھینکنا، خوراک کی کمی، پیٹ اور جگر کے کیزے، موسم کی شدت، پانی کی کمی، تھنوں کی خرابی اور کوئی بیماری وغیرہ۔ جس جانور کا دودھ کم ہوا ہے "اکسیر دودھ گریٹولز" صبح و شام 10 گرام فی خوراک کھلائیں۔ عموماً آٹھ سے دس خوراکیں کافی ہیں۔ لیکن دودھ کی کمی کی مذکورہ وجوہات کا تدارک اور علاج بھی لازمی ہے۔

اکسیر سوزش پستان

تھنوں اور حیوانہ کی سوزش (سمازو) کیلئے
For acute mastitis i.e. inflammation of udder & teats

تھنوں اور حیوانہ کی سوزش کی وجوہات بیکٹیریا اور وائرس کی انفیکشن چوٹ اور زخم ہیں۔ لہذا جانور کو صاف ستھری اور آرام دہ جگہ پر باندھنا چاہیے۔ نیز عدم صفائی، وقت پر دودھ نہ دوسنے اور انگوٹھا دھرا کر کے دودھ نکالنے سے بھی

سوزش اور انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سوزش پستان" نمبر وار ایک ایک پیکٹ حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ اگر سوزش کیساتھ دودھ میں مہلکیاں وغیرہ بھی ہوں تو "اکسیر سوزش پستان" کے ہر پیکٹ کے ساتھ "اکسیر خرابی دودھ" بھی نمبر وار ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ خراب دودھ تھنوں سے لازماً نکال دیں لیکن کوئی چیز مثلاً پرندے کا پر یا تنکا وغیرہ ہرگز تھن میں داخل نہ کریں اور مرض کی مکمل سیخ کنی کیلئے ایک ڈبی "اکسیر گلٹی پستان کپسولز" بھی استعمال کروادیں۔ اگر تھنوں پر کوئی ظاہری زخم وغیرہ بھی ہو تو "کیوریو آئل" یا اینٹی سپٹک آئینٹمنٹ لگائیں۔ (نیز دیکھیں "اکسیر گلٹی پستان کپسولز")

تھنوں کے پھٹنے اور السرو وغیرہ کیلئے
For cracked or chapped teats

موسم کی شدت اور دیگر وجوہات کے باعث بعض اوقات جانور کے تھنوں کی جلد پھٹ جاتی ہے اور اس سے تھوڑا سا خون رستا ہے۔ ایسی صورت میں "اکسیر کریک پستان" بارہ بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ نیز تھنوں پر صبح شام "کیوریو آئل" یا اینٹی سپٹک آئینٹمنٹ لگائیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔

تھنوں اور جلد کے زخموں کیلئے
A healer of skin and teats

تھنوں کے پھٹنے، ہر قسم کے زخموں اور دیگر جلدی امراض مثلاً خارش اور ایگزیم وغیرہ پر لگانے کیلئے مفید آئل ہے۔

تھنوں اور حیوانہ کی گلتیوں، نازوں، منہ سڑی اور رسولی وغیرہ کیلئے
For chronic or fibrotic mastitis.

تھنوں یا حیوانہ کی گلتیاں اور نازیں وغیرہ دراصل "فائبرٹسوز" ہیں۔ جو انفیکشن، سوزش اور چوٹ وغیرہ کے بعد درست علاج نہ ہونے کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے حیوانہ میں دودھ کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر گلٹی پستان کپسولز" دن میں چار یا پانچ دفعہ ایک ایک کپسول کھلائیں، اور تریاق زہر باد روزانہ دودھ کپسولز آٹھ دن تک کھلائیں۔ اگر تھنوں یا حیوانہ پر سوزش بھی ہو تو "اکسیر سوزش پستان" صبح شام ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ متاثرہ تھن میں سے دوھتے وقت دودھ ضرور نکال دینا چاہیے لیکن تھن میں کوئی چیز مثلاً پرندے کا پر یا تنکا وغیرہ داخل نہیں کرنا چاہیے اگر دودھ نکالنا بہت مشکل ہو تو دودھ نکالنے کی نالی (Milk Syphon) جراثیم سے پاک کر کے اس پر "کیوریو آئل" لگا کر تھن سے دودھ نکالیں۔ مکمل آرام آنے تک علاج جاری رکھیں۔

بدمزاج ضدی اور غصیلے جانوروں کیلئے
For ill tempered animals.

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "متفرق امراض کیلئے ادویات"

دودھل جانوروں میں کیلشیم کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے
For milk fever, hypocalcemia

یہ مرض بہت زیادہ دودھ دینے والی گائے بھینسوں میں سونے کے بعد ہوتا ہے جب کہ دودھ کے ذریعے یکدم جسم سے بہت سا کیلشیم نکل جائے۔ پہلے بھوک اور دودھ یکدم کم ہو جاتا ہے اور پچھلی ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں۔ پھر جانور لیٹ

اکسیر مزاج

اکسیر ملک فیور

جاتا ہے اور اٹھ نہیں سکتا۔ سر موڑ کر پہلو (دکھی) کے ساتھ لگا لیتا ہے گو برا اور پیشاب بند ہو جاتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آنکھیں پتھر جاتی ہیں ایسی صورت میں جانور کو "اکسیر ملک فیور" مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ، گھنٹہ چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ جانور کو دودھ میں گلوکوز یا کیلشیم کی گولیاں ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ دودھ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ مکمل آرام آنے تک علاج جاری رکھیں۔

سونے کے بعد جانور کی اندرونی صفائی (میلا پیپینکے) کیلئے
For Complete Discharge of Lochia

اکسیر نفاس

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "امراض افزائش نسل کیلئے ادویات"

(B)۔ امراض افزائش نسل کیلئے

TREATMENT OF THE DISEASES OF REPRODUCTIVE SYSTEM

پرسوتی بخار اور سونے کے بعد انفیکشن کیلئے
For post natal septecemia and infection of the uterus etc

اکسیر پرسوت

بچہ دینے کے بعد جانور کے رحم کی پوری صفائی نہ ہونے سے سپٹک مادہ (گلا سٹراز ہریلا مواد) پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے جراثیم خون میں شامل ہو کر جانور کو پرسوتی بخار ہو جاتا ہے۔ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، جانور کھانا پینا اور جگالی بند کر دیتا ہے، کانپتا ہے، جسم کو جھٹکے لگتے ہیں اور جانور اٹھ نہیں سکتا، آنکھ کی جھلی، منہ اور مقعد کی میوکس ممبرین میں خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر پرسوت" مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ نوٹ: تندرست جانور کو پرسوت، انفیکشن اور دیگر مسائل سے حفظ مالتقدم کیلئے سونے کے بعد "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکیٹ تین دن تک کھلائیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سوزش کیلئے
For Septicemia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "متفرق امراض کیلئے ادویات"

اکسیر تسہیل ولادت

بچہ دینے (سونے) میں دقت اور تکلیف کیلئے
For Dystocia

بعض اوقات جانور کو سونے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے لیکن بچہ باہر نہیں آتا۔ اس کی وجوہات میں جانور کی کمزوری، رحم کی حرکات میں کمی، رحم کا منہ بند ہونا اور رحم میں بچہ کی پوزیشن درست نہ ہونا وغیرہ ہیں۔ ایسی صورت میں جانور کو "اکسیر تسہیل ولادت" حسب ضرورت دس منٹ سے تیس منٹ کے وقفہ سے دو چار خوراکیں کھلائیں۔ بفضلہ تعالیٰ چار پانچ پیکیٹس کھلانے سے بچہ باہر آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو امکان ہے کہ بچہ مارل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جانوروں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سونے کیلئے بچے کو بہت زور سے کھینچنا اور جھٹکے مارنا مایہ کیلئے سخت نقصان دہ ہے۔

اکسیر جیر گریولز

جیر (آنول) نہ گرانے کی تکلیف کیلئے

For retention of placenta

جانور کو سونے کے بعد بارہ گھنٹہ کے اندر جیر گرا دینی چاہیے۔ لیکن بعض جانور وقت پر جیر نہیں گراتے۔ ایسی صورت میں اکسیر جیر گریولز دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً پانچ سے دس پیکٹس کافی ہیں۔ چوبیس گھنٹے تک جیر نہ گرانے سے انفیکشن ہو سکتی ہے اس صورت میں ”تریاق زہر باد کپسولز“ دن میں تین دفعہ ساتھ کھلائیں۔ اگر کسی جانور کا بچہ پیٹ میں مر جائے تو اسے نکالنے کیلئے ”اکسیر جیر گریولز“ دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے اور ”تریاق زہر باد کپسولز“ چھ چھ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ نوٹ: جیر کو زبردستی کھینچ کر نہیں نکالنا چاہیے اس سے جانور کے رحم اور دودھ کی پیدائش کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی جانور میں جیر کا مسئلہ ہر دفعہ پیدا ہو جائے تو اسے سونے کے بعد چھ ماہ سے پہلے حمل نہیں کرنا چاہیے۔

اکسیر حمل

مادہ جانوروں کے بانجھ پن کیلئے

For infertility of female animals

بعض مادہ جانور گرم نہیں ہوتیں یا ان کا حمل ٹھہرنا نہیں، اس کی وجوہات جانور کی کمزوری، حد سے زیادہ موٹاپا، رحم کی کمزوری اور نظام تولید کی انفیکشن وغیرہ ہیں۔ ایسے جانور کو ”اکسیر حمل“ چار پیکٹس (روزانہ ایک پیکٹ نمبر وار) کھلانا کافی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو دو ہفتہ کے بعد پھر چار پیکٹس کھلانے سے بفضلہ تعالیٰ مادہ جانور گرم ہو جائیگی۔ اگر نظام تولید کی انفیکشن ہو تو ”تریاق زہر باد کپسولز“ دو کپسولز روزانہ پانچ دن کھلائیں اور پھر ”اکسیر حمل“ کا ایک کورس (چار پیکٹس) کھلائیں اور نہ جانور کیساتھ رکھیں۔ گرم خوراک دیں وقت پر حاملہ کروائیں اور جانور کی صحت کا خیال رکھیں۔

اکسیر رحم

اوانس یا پیچھا نکالنے کیلئے

For prolapse of vagina and uterus

بعض مادہ جانور اوانس (اندرونی اعضاء) باہر نکالتی ہیں۔ اس کی وجہ اندرونی اعضاء اور پٹھوں کی کمزوری، پیٹ کے اعضاء کا رحم پر دباؤ اور انفیکشن وغیرہ ہیں۔ نیز اگر بچہ یا جیر کو زبردستی کھینچ کر باہر نکالا جائے تو سونے کے بعد یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر رحم“ حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے نمبر وار کھلائیں۔ عموماً چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ نیز ”اکسیر رحم“ کے ہر پیکٹ کے ساتھ ”تریاق زہر باد کپسولز“ کے دو کپسولز کھلائیں۔ جانور کو رسی کا چھکا (Truss) چڑھا دیں۔ پانی زیادہ پلائیں نرم غذا دیں اور پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھلائیں۔ نیز جانور کو ڈھلوان سطح پر باندھیں تاکہ وہ آگے سے نیچا رہے اور اس کا پچھلا حصہ اونچا رہے۔

نوٹ: اوانس چڑھانا ہو تو کیورینٹینچر کے 10 فیصد لوشن سے صاف کر کے صاف ہاتھوں سے احتیاط سے چڑھائیں۔ سوڈیم کے بعد نمکیات کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے

For hypocalcemia

اکسیر ملک فیور

تفصیل کے لئے دیکھیں زیر عنوان ”دودھل جانوروں کیلئے ادویات“

اکسیر جیر گریولز

جیر (آنول) نہ گرانے کی تکلیف کیلئے

For retention of placenta

جانور کو سونے کے بعد بارہ گھنٹہ کے اندر جیر گرا دینی چاہیے۔ لیکن بعض جانور وقت پر جیر نہیں گراتے۔ ایسی صورت میں اکسیر جیر گریولز دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً پانچ سے دس پیکٹس کافی ہیں۔ چوبیس گھنٹے تک جیر نہ گرانے سے انفیکشن ہو سکتی ہے اس صورت میں ”تریاق زہر بادکپسولز“ دن میں تین دفعہ ساتھ کھلائیں۔ اگر کسی جانور کا بچہ پیٹ میں مر جائے تو اسے نکالنے کیلئے ”اکسیر جیر گریولز“ دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے اور ”تریاق زہر بادکپسولز“ چھ چھ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ نوٹ: جیر کو زبردستی کھینچ کر نہیں نکالنا چاہیے اس سے جانور کے رحم اور دودھ کی پیدائش کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی جانور میں جیر کا مسئلہ ہر دفعہ پیدا ہو جائے تو اسے سونے کے بعد چھ ماہ سے پہلے حمل نہیں کرنا چاہیے۔

اکسیر حمل

مادہ جانوروں کے بانجھ پن کیلئے

For infertility of female animals

بعض مادہ جانور گرم نہیں ہوتیں یا ان کا حمل ٹھہرتا نہیں، اس کی وجوہات جانور کی کمزوری، حد سے زیادہ موٹاپا، رحم کی کمزوری اور نظام تولید کی انفیکشن وغیرہ ہیں۔ ایسے جانور کو ”اکسیر حمل“ چار پیکٹس (روزانہ ایک پیکٹ نمبر وار) کھلانا کافی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو دو ہفتہ کے بعد پھر چار پیکٹس کھلانے سے بفضلہ تعالیٰ مادہ جانور گرم ہو جائیگی۔ اگر نظام تولید کی انفیکشن ہو تو ”تریاق زہر بادکپسولز“ دو کپسولز روزانہ پانچ دن کھلائیں اور پھر ”اکسیر حمل“ کا ایک کورس (چار پیکٹس) کھلائیں اور نر جانور کیساتھ رکھیں۔ گرم خوراک دیں وقت پر حاملہ کروائیں اور جانور کی صحت کا خیال رکھیں۔

اکسیر رحم

اوانس یا پیچھا نکالنے کیلئے

For prolapse of vagina and uterus

بعض مادہ جانور اوانس (اندرونی اعضاء) باہر نکالتی ہیں۔ اس کی وجہ اندرونی اعضاء اور پٹھوں کی کمزوری، پیٹ کے اعضاء کا رحم پر دباؤ اور انفیکشن وغیرہ ہیں۔ نیز اگر بچہ یا جیر کو زبردستی کھینچ کر باہر نکالا جائے تو سونے کے بعد یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر رحم“ حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے نمبر وار کھلائیں۔ عموماً چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ نیز ”اکسیر رحم“ کے ہر پیکٹ کے ساتھ ”تریاق زہر بادکپسولز“ کے دو کپسولز کھلائیں۔ جانور کو رسی کا چھکا (Truss) چڑھا دیں۔ پانی زیادہ پلائیں نرم غذا دیں اور پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھلائیں۔ نیز جانور کو ڈھلوان سطح پر باندھیں تاکہ وہ آگے سے نیچا رہے اور اس کا پچھلا حصہ اونچا رہے۔

نوٹ: اوانس چڑھانا ہو تو کیوریٹو پنچر کے 10 فیصد لوشن سے صاف کر کے صاف ہاتھوں سے احتیاط سے چڑھائیں۔ سونے کے بعد نمکیات کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے

or hypocalcemia

اکسیر ملک فیور

تفصیل کے لئے دیکھیں زیر عنوان ”دودھل جانوروں کیلئے ادویات“

سونے کے بعد جانور کی اندرونی صفائی (میلا پیپنکٹ) کیلئے
For Complete Discharge of Lochia

اکسیر نفاس

بچہ دینے کے بعد جانور کے رحم سے ایک خاص قسم کی خون آمیز رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ رطوبت کم و بیش دس دن تک جاری رہتی ہے۔ اگر رحم سے اس رطوبت کا مکمل اخراج نہ ہو تو جانور میں بھوک کی کمی، کمزوری، بخار اور دودھ کی کمی وغیرہ واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکٹ تین چار دن کھلائیں۔ نیز ہر جانور کو سونے کے بعد "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکٹ تین چار روز تک کھلانے سے پورا دودھ اترنے کے علاوہ انفیکشن اور دیگر مسائل کا تدارک بھی ہوتا ہے۔

(C)۔ نظام ہضم کے امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

عمومی نوٹ: جانوروں کو صاف ستھرا تازہ پانی پلائیں اور تازہ صاف چارہ کھلائیں جو موسم کی شدت سے بہت گرم یا ٹھنڈا نہ ہوا ہو۔ ایک ہی قسم کے بجائے چارہ بدل بدل کر دیں اور بھوسہ (توڑی) بھی کھلائیں۔ کھری میں نمک رکھیں اور جانوروں کو کچھ وقت چرانے کیلئے کھلا بھی چھوڑا کریں۔

جانوروں کے پیٹ میں ہوا بھرنے (آپہرنے) کی دوا
For tympany

اکسیر اچھارہ

اچھارہ کا سبب نرم سبز چارہ مثلاً شفتل، برسم، گلاسٹرا خمیرہ چارہ، نیز دانے اور روٹی کے ٹکڑے زیادہ کھا کر پانی پی لینا وغیرہ ہیں۔ اس سے پیٹ میں زہریلی گیسیں پیدا ہو کر جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جانور مشکل سے سانس لیتا اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مرض مہلک ہے۔ شدید خطرہ کی حالت میں پانچ منٹ کے وقفہ سے نسبتاً آرام میں پندرہ منٹ یا ایک گھنٹے کے وقفہ سے "اکسیر اچھارہ" کھلائیں۔ عموماً دو تین پیکٹس بفضلہ تعالیٰ کافی ہیں۔ ایمر جنسی کی وجہ سے اس دوا کو ہر وقت جانوروں والے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔

پیشاب اور پاخانہ کی رکاوٹ اور پیٹ درد کیلئے
For Colic, Impaction and Retention of Urine

اکسیر بندش

پاخانہ اور پیشاب کی رکاوٹ، قبض اور پیٹ درد گھوڑوں اور خچروں کے علاوہ مویشی میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ معدہ اور آنتوں کی کمزوری، خشک اور مقوی خوراک زیادہ کھا جانا، پانی کم پینا، گردے کی پتھری، گنداپانی اور ناقص چارہ کھانا وغیرہ ہیں۔ جانور بے چین ہوتا ہے۔ ٹانگ کو پیٹ پر اور زمین پر مارتا ہے اور پیشاب کیلئے زور لگاتا ہے۔ قبض کی صورت میں پیٹ پھول جاتا ہے۔ شدید تکلیف میں "اکسیر بندش" پندرہ پندرہ منٹ بعد اور نسبتاً آرام میں دو چار گھنٹے بعد کھلائیں۔ عموماً چھ سے آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ آرام آنے کے بعد جانور کو نرم اور زود ہضم خوراک دیں اور پانی زیادہ پلائیں۔

اکسیر خونی پیچش

پاخانہ میں خون اور بلغم (آؤں) وغیرہ آنے کی دوا
For Dysentery

انترائیوں کے پیراسائٹس اور نظام ہضم کی خرابی کے باعث جانور کو پیچش کی دیگر علامات کے علاوہ گوبر میز، جھاگ اور

لیسدار مواد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کی وجہ سے کچھ دیر بعد گوبر کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر خونی پیچش" صبح دوپہر شام ایک ایک پیکٹ دیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کی صورت میں "اکسیر کرم" استعمال کروائیں۔

پیٹ میں ہوا کی پرانی تکلیف کیلئے
For Chronic Tympanites.

بعض جانور میں نظام ہضم کی کمزوری، معدہ کی تیز ابیت، بادی خوراک اور دیگر وجوہات کے باعث بھوک کی کمی، ہاضمہ کی خرابی، منہ سے رال اور بدبو اور پیٹ میں اکثر ہوا رہتی ہے۔ جانور تکلیف محسوس کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا گوبر کرتا رہتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر رتج و بادی" صبح شام کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

پیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy For Intestinal Worms & Liver Fluke.

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "متفرق امراض کیلئے ادویات"

لکڑی، ہڈیاں، گوبر اور کھڑے وغیرہ کھانے کی عادت کیلئے

For Pica of Litter

معدہ اور ہاضمہ کی خرابی اور خوراک میں ضروری اجزاء مثلاً کیلشیم، فاسفورس اور کوبالٹ جیسے نمکیات کی کمی کے باعث بعض جانور ہڈیاں، چمڑہ، لکڑی، کپڑا اور گوبر وغیرہ کھاتے ہیں اور کمزور ہو کر دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر گندگی چھوڑ" صبح شام ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔ نیز جانور کی کھری میں نمک کا ڈھیلا رکھیں، ونڈا اور کھل کھلائیں اور جانور کو چرنے کیلئے کھلا چھوڑا کریں۔

مٹی کھانے کی عادت کیلئے

For Pica i.e. Licking earth.

جانوروں میں مٹی کھانے کی عادت ہاضمہ اور معدہ کی خرابی کے علاوہ غذا میں اہم اجزاء اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو سخت نقصان دہ ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر مٹی چھوڑ" نمبر وار روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ نیز ایسے جانور کو کھل اور ونڈا کھلائیں۔ کھری میں نمک کا ڈھیلا رکھیں اور چرنے کیلئے کھلا چھوڑا کریں۔

منہ کھر یا موکھر کیلئے

For Foot and Mouth Disease

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات"

منہ کھر کیلئے حفظ ماتقدم

Prophylactic for Foot and Mouth

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات"

واہ، موک یا اسہال کیلئے

For Diarrhea

معدہ کی کمزوری، ہنر چارے کی زیادتی، زیادہ کھا جانے اور انفیکشن کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں وغیرہ کے باعث جانوروں کو واہ یا اسہال کا مرض ہو جاتا ہے۔ جس سے جانور کمزور ہو کر دودھ اور کارکردگی کم کر دیتا ہے۔ اسے جانور

کو حسب ضرورت "اکسیر واہ کپسولز" چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک تین چار بار دیں آرام آنے کے بعد ایک یا دو مرتبہ دیں۔ نظام ہضم کی انفیکشن کی صورت میں "تریاق زہر باد کپسولز" صبح و شام کھلائیں۔ نوٹ: اگر واہ کا باعث پیٹ یا جگر کے کیڑے ہوں تو "اکسیر کرم" کھلائیں

ویائی اسہال، موٹ سے حفظ ما تقدم کیلئے

Prophylactic for Diarrhea

واہ روک

اگر واہ کا مرض وبائی صورت میں ہو تو بطور حفظ ما تقدم ہر تندرست جانور کو صرف دو پیکیٹس "واہ روک" (ایک صبح ایک شام) کھلا دیں تاکہ جانور واہ کی بیماری سے محفوظ رہے۔

هاضمه اور بھوک کی کمی کیلئے

For indigestion and Inappetence

اکسیر ہضم و بھوک گرنیولز

جانوروں میں ہاضمہ کی جملہ خرابیوں مثلاً بھوک کی کمی، بد ہضمی، پیٹ میں ہوا اور طبیعت کی سستی کو دور کرتی ہے اور بھوک بڑھا کر بفضلہ تعالیٰ جانور کی صحت، دودھ اور کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرام اور بڑے جانور کو دس گرام فی خوراک چار بار یا چوبیس گھنٹہ کے وقفہ سے کھلائیں۔

(D)۔ مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE FATAL AND EPIDEMIC DISEASES

تشخیص نہ ہو سکنے والے شدید امراض کیلئے

For Undiagnosed Aliments and Emergencies

اکسیر اعظم

جب کسی تکلیف میں مرض سمجھ نہ آ رہا ہو یا متعلقہ دوائی نہ مل رہی ہو اور جانور کو شدید تکلیف ہو "اکسیر اعظم" مرض کی شدت کے مطابق پندہ منٹ، گھنٹہ یا چار گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ بفضلہ تعالیٰ فوری افاقہ ہوگا۔

پیٹ میں ہوا بھرنے (آبھرنے) کی دوا

For Tympany

اکسیر اچھارہ

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "نظام ہضم کے امراض کیلئے ادویات"

پرسوتی بخار اور سونے کے بعد انفیکشن کیلئے

For Post Natal Speticemia & Infection of Uterus

اکسیر پرسوت

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "امراض افزائش نسل کیلئے ادویات"

پیشاب میں خون آنے، رت موٹرا کیلئے

For Red Water Disease, Babesiosis

اکسیر سرکن کپسولز

سرکن کا سبب ایک پروٹوزوا "بیبیسوزیا" ہے جو چمڑیوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ نیز فاسفورس، بیکشیم اور دیگر نمکیات کی کمی بھی اس کا باعث ہے۔ اس مرض میں جانور کے خون کے سرخ سیلز تباہ ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں جس سے پیشاب کا رنگ سرخی یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور جانور کو قبض بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سرکن کپسولز" دو کپسولز فی خوراک دو دو گھنٹہ بعد کھلائیں۔ جب نسبتاً آرام ہو تو چار یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب

ضرورت کھلائیں۔ نیز اگر سرکن کے ساتھ قبض بھی ہو تو ”اکسیر سرکن کپسولز“ کی ہر دوسری خوراک کے ساتھ ”اکسیر بندش“ بھی ایک ایک پیکٹ کھلا دیں۔ سرکن کے مریض جانور کو صبح شام دودھ پلانا اور مقوی قبض کشا خوراک دینا بھی بہت مفید ہے۔

گل گھوٹو کیلئے

For Hemorrhagic Septicemia

اس مرض کا بیکٹیریا جانور کے خون میں سخت انفیکشن پیدا کر کے خون کی باریک رگوں کو پھاڑ دیتا ہے اور جسم کو پوری آکسیجن نہیں پہنچتی۔ جانور کو گلے پر سوجن اور بخار ہو جاتا ہے منہ سے رال بہتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ڈکارنے کی آواز نکلتی ہے۔ ایسے جانور کو مرض کی شدت کے مطابق حسب ضرورت پندرہ منٹ یا ایک گھنٹے کے وقفہ سے ”اکسیر گل گھوٹو“ کھلائیں۔ نسبتاً آرام ہو تو چار چار گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔

گل گھوٹو کی وباء سے بچانے کیلئے (حفظ ماتقدم)

Prophylactic for H. S.

گل گھوٹو روک

گل گھوٹو کی وبا بارش کے موسم میں نمودار ہوتی ہے۔ بیماری سے بچاؤ کیلئے ہر تندرست جانور کو (بطور حفظ ماتقدم) صرف دو پیکٹس (ایک صبح ایک شام) ”گل گھوٹو روک“ کھلائیں۔

کیلشیم اور نمکیات کی کمی سے فالج کیفیت کیلئے

For Milk Fever, Hypocalcemia

اکسیر ملک فیور

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان ”دودھل جانوروں کیلئے ادویات“

منہ کھریا موکھر کیلئے

For Foot and Mouth Disease

اکسیر منہ کھر

اس متعدی مرض کا باعث ایک وائرس ہے۔ اس کی علامات جانور کے منہ اور پاؤں میں چھالے اور زخم ہیں۔ جانور لنگڑاتا ہے اور کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ منہ سے رالیں بہتی ہیں اور جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر منہ کھر“ حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ جانور کو کترا ہوا نرم چارم دیں اور پاؤں کے زخموں کی فینائل وغیرہ سے صفائی کریں۔ تاکہ کھیاں وغیرہ بیٹھ کر کیڑے پیدا نہ ہوں۔

منہ کھر کی وباء سے بچانے کیلئے حفظ ماتقدم

Prophylactic For Foot and Mouth Disease

منہ کھر روک

یہ متعدی مرض عموماً خزاں یا بہار میں مویشیوں اور بھیڑ بکریوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر تندرست جانور کو مرض کے حملے سے بچاؤ کیلئے (بطور حفظ ماتقدم صرف دو پیکٹس (ایک صبح ایک شام) ”منہ کھر روک“ کھلائیں۔

(E)۔ جلدی امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE SKIN DISEASES

اکسیر جلد

جلدی امراض مثلاً خارش کیلئے
For General Skin Problems

جانوروں میں بیکٹیریا یا فنگس اور Mites وغیرہ کے باعث متفرق جلدی امراض مثلاً خارش، ایگزیم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ جانور خارش کرتا اور جسم کو مختلف چیزوں سے رگڑتا ہے جس سے بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں کھال خراب ہو جاتی ہے اور جانور کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور ”اکسیر جلد“ نمبر وار روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ نیز ”کیوریٹو آئل“ جلد پر اچھی طرح لگائیں۔ ضرورت ہو تو دس پندرہ دن بعد دوبارہ اکسیر جلد کھلائیں۔ جانور کو صاف ستھرا رکھیں اور صاف پانی سے نہلائیں۔

اکسیر چیچڑی

چیچڑوں اور جوئوں کیلئے
For Ticks and Lice Infestation

صفائی کی کمی، گندے تالابوں میں نہانے، گندے جانوروں کے ساتھ رہنے اور وٹامن B وغیرہ کی کمی سے جانور کو چیچڑیاں اور جوئیں پڑ جاتی ہیں جو جانور کا خون چوس کر اسے کمزور کرتی اور اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتی ہیں۔ نیز جلدی امراض کے علاوہ فالج، سرکن اور بخار وغیرہ کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ایسے جانور کو اکسیر چیچڑی نمبر وار روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

کیوریٹو آئل

تھنوں اور جلد کے زخموں کیلئے
A Healer of Skin and Teats

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان ”دودھل جانوروں کیلئے ادویات“

تھنوں اور ڈم وغیرہ کے گلنے (موہری) کی دوا
For Gangrene

اکسیر گینگرین

گینگرین ایسا زخم ہے جو بدبودار ہوتا ہے اور خراب ہو کر بڑھتا جاتا ہے۔ کیونکہ جسم کے اس حصہ میں خون کی سپلائی کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات زخم پر مسلسل دباؤ، بار بار دکھنا، شدید گرمی یا سردی کا اثر، جراثیم کی انفیکشن اور کیمیائی اجزاء کا اثر وغیرہ ہیں۔ جلد کے علاوہ یہ مرض دم، کانوں کے سروں اور تھنوں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر گینگرین“ نمبر وار روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ زخم پر ”کیوریٹو آئل“ لگائیں۔ یہ دکھنے سے بچائیں۔ صاف ستھرا رکھیں اور کوئے اور دوسرے جانوروں سے بچائیں۔

(F) - متفرق امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE MISCELLANEOUS DISEASE

تشخیص نہ ہو سکنے والے شدید امراض کیلئے
For Undiagnosed Ailments & Emergencies

اکسیر اعظم

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان ”مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات“

جانوروں کے بخار وغیرہ کیلئے
For Fever, Pyrexia

کیوریٹو (اکسیر بخار)

بخار کی وجہ جراثیم کی انفیکشن، حشرات کا کاٹنا، چوٹ، موسم کی تبدیلی اور چارہ کا اثر وغیرہ ہیں۔ بخار میں جانور کا نہر پتھر بڑھ جاتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر بخار“ مرض کی شدت کے مطابق دو گھنٹے چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سوزش کیلئے
For Septicemia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

جسم کے کسی حصے میں انفیکشن، سوزش اور تعفن واقع ہونے کو زہر باد کہتے ہیں۔ یہ علامات جلد کے علاوہ نظام ہضم اور نظام تولید میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ معدہ کی انفیکشن اور ہاضمہ کی خرابی میں جانور کے منہ سے بو آتا، سونے کے بعد رحم میں زہریلے مادوں کی وجہ سے پرسوتی بخار، جیر کے ٹکڑے اندر رہ جانے سے انفیکشن و بخار اور تھنوں کی سوزش غرض ہر قسم کی انفیکشن میں ”تریاق زہر باد کپسولز“ چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک بارہ سے چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔

جسمانی کمزوری اور نشوونما کی کمی کیلئے
A Tonic for General Dability

ٹانک گرنیولز

جب جانور میں کسی ظاہری تکلیف یا بیماری کے بغیر بھوک کی کمی، جسمانی کمزوری اور دودھ کی پیداوار متاثر ہو تو ”ٹانک گرنیولز“ سے بفضلہ تعالیٰ جانور کی صحت و کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرام اور بڑے جانور کو دس گرام فی خوراک صبح و شام دیں۔

ٹنک، سنک ٹنک، جکڑوا اور گرم سرد ہو جانے کیلئے
For Emaciation & Effects of Cold & Dampness on Skin & Body

اکسیر ٹنک کپسولز

گرم سرد ہونے، سردی لگنے یا جسم میں نمکیات کی کمی سے بعض اوقات جانور کی جلد اکڑ جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جانور کھانا پینا اور چلنا پھرنا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کو ٹنک، سنک ٹنک یا جکڑوا کہتے ہیں۔ آنٹوں کا ایک پیراسائٹ Cooperia بھی اس کا باعث ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر ٹنک کپسولز“ دو دو کپسولز چار گھنٹے، بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ اگر جانور کو بخار بھی ہو تو ”اکسیر بخار“ بھی ساتھ کھلائیں۔ (نیز

(F)۔ متفرق امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE MISCELLANEOUS DISEASE

تشخیص نہ ہو سکنے والے شدید امراض کیلئے
For Undiagnosed Ailments & Emergencies

اکسیر اعظم

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان ”مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات“

جانوروں کے بخار وغیرہ کیلئے
For Fever, Pyrexia

کیوریٹو (اکسیر بخار)

بخار کی وجہ جراثیم کی انفیکشن، حشرات کا کاٹنا، چوٹ، موسم کی تبدیلی اور چارہ کا اثر وغیرہ ہیں۔ بخار میں جانور کا نمبر بچر بڑھ جاتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر بخار“ مرض کی شدت کے مطابق دو گھنٹے چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سوزش کیلئے
For Septicemia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

جسم کے کسی حصے میں انفیکشن، سوزش اور تعفن واقع ہونے کو زہر باد کہتے ہیں۔ یہ علامات جلد کے علاوہ نظام ہضم اور نظام تولید میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ معدہ کی انفیکشن اور ہاضمہ کی خرابی میں جانور کے منہ سے بو آتا، سونے کے بعد رحم میں زہریلے مادوں کی وجہ سے پرسوتی بخار، جیر کے ٹکڑے اندر رہ جانے سے انفیکشن و بخار اور تھنوں کی سوزش غرض ہر قسم کی انفیکشن میں ”تریاق زہر باد کپسولز“ چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک بارہ سے چوبیس گھنٹہ کے وقفہ سے کھلائیں۔

جسمانی کمزوری اور نشوونما کی کمی کیلئے
A Tonic for General Dability

ٹانک گرنیولز

جب جانور میں کسی ظاہری تکلیف یا بیماری کے بغیر بھوک کی کمی، جسمانی کمزوری اور دودھ کی پیداوار متاثر ہو تو ”ٹانک گرنیولز“ سے بفضلہ تعالیٰ جانور کی صحت و کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرام اور بڑے جانور کو دس گرام فی خوراک صبح و شام دیں۔

ٹک، سک ٹک، جکڑوا اور گرم سرد ہو جانے کیلئے
For Emaciation & Effects of Cold & Dampness on Skin & Body

اکسیر ٹک کپسولز

گرم سرد ہونے، سردی لگنے یا جسم میں نمکیات کی کمی سے بعض اوقات جانور کی جلد اکڑ جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جانور کھانا پینا اور چلنا پھرنا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کو ٹک، سک ٹک یا جکڑوا کہتے ہیں۔ آنٹوں کا ایک پیراسائٹ Cooperia بھی اس کا باعث ہے۔ ایسے جانور کو ”اکسیر ٹک کپسولز“ دو، دو کپسولز چار گھنٹے، بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ اگر جانور کو بخار بھی ہو تو ”اکسیر بخار“ بھی ساتھ کھلائیں۔ (نیز

دیکھیں "اسیر نمونیہ وز کام" (سک ٹک والے جانور کونمکیات پر مشتمل پاؤں ردیں اور چرنے کیلئے کھلا چھوڑا کریں۔

اکسیر چشم

آنکھوں کی سرخی، گیدوں اور دیگر تکالیف کیلئے
For Eyes Inflammation and Allergy

آنکھ پر خراش، انفیکشن یا باضمہ کی خرابی اور دیگر وجوہات کے باعث بعض اوقات جانوروں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان سے پانی بہتا ہے اور گید آتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر چشم" تکلیف کی شدت کے مطابق چار آٹھ یا بار گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

اکسیر چوٹ

اندرونی و بیرونی چوٹوں اور تھکن و دکھن کیلئے
For Injuries and Fatigue

اندرونی و بیرونی ہر قسم کی چوٹوں، ہڈیوں کے ٹوٹنے اور زیادہ کام کرنے سے تھکن اور دکھن وغیرہ کیلئے بفضلہ توالی بہت مفید ہے۔ تکلیف کی شدت کے مطابق "اکسیر چوٹ" پندرہ منٹ، ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے نمبر وار کھلائیں۔ ہڈی ٹوٹی ہو تو ہڈی کو درست جگہ پر بٹھا کر پٹی یا پلستر کر دیں اور اکسیر چوٹ ایک ایک ہفتہ کے وقفہ سے تین کورس (چار پیکٹس فی کورس) کھلا دیں۔ بیرونی زخموں پر "کیوریو آئل" لگائیں۔ نوٹ گھوڑوں میں ریس کی تھکاوٹ کیلئے بہترین دوا ہے۔

اکسیر درد کپسولز

گنتھیاوی اور جسمانی دردوں کیلئے
For Rheumatic Pains.

گنتھیاوی دردوں میں جانور کے جوڑ سوج جاتے ہیں، ان کا نمپر پچر بڑھ جاتا ہے اور درد ایک جوڑے سے دوسرے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا باعث جوڑوں میں "یورک ایسڈ" کی زیادتی ہے اور اس کی وجہ بارش میں بھیگنا، ٹھنڈ لگنا، غذا کا زہر اور انفیکشن وغیرہ بھی ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر درد کپسولز" تکلیف کی شدت کے مطابق چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک ایک یا دو مرتبہ روزانہ دیں۔ آرام آنے تک جانور سے کام نہ لیں۔

ٹانگوں کی تکلیف سرن کی دوا
For Stringhalt

اکسیر سرن کپسولز

یہ مرض مویشیوں کے علاوہ کبھی کبھی گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ جانور کو ٹانگ اٹھانے میں دقت ہوتی ہے اور پھر جھٹکے سے ٹانگ کو نیچے رکھتا ہے۔ پچھلی ایک یا دو ٹانگیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس مرض کا تعلق حرام مغز اور شیناٹک عصب (Sciatic Nerve) سے ہے اس لئے بروقت علاج ضروری ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سرن کپسولز" دو دو کپسولز فی خوراک صبح و شام دیں آرام ہونے پر روزانہ دیں۔ جانور کو سردی اور گرمی سے بچائیں اور آرام (Rest) کرنے دیں۔

فالج اور فالجی کیفیات کیلئے
For Paralysis or Palsy

اکسیر فالج

فالج کا مرض دماغ اور اعصابی نظام میں خلل کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اسکی وجوہات میں انفیکشن، منومی اثرات، کسی زہر کا اثر اور اعصاب پر چوٹ و دباؤ وغیرہ ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر فالج" حسب ضرورت چار، بارہ یا چوبیس گھنٹے

کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔ (نیز دیکھیں "اکسیر ملک فیور، اکسیر پرسوت، اکسیر سرن")

پیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy for Intestinal Worms & Liver Fluke.

اکسیر کرم

گنداپانی پینے، مٹی چاٹنے اور متاثرہ چارہ کھانے سے مختلف کیڑوں کے انڈے اور لاروے جانور کے جسم میں جا کر پرورش پاتے ہیں۔ ان کیڑوں میں معدے اور آنتوں کے ورمز اور لیور فلوک (جگر کی جونکیں) وغیرہ شامل ہیں جو جانور کو کمزور کر کے اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات نچلے جڑے کے نیچے غدود بھی سوج جاتے ہیں جسے لوگ غلطی سے گلہڑ کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر کرم" صبح و شام صرف ایک دن پلا دیں خوراک کی دہرائی ایک ماہ کے بعد پھر کریں۔ تاکہ آئندہ بھی کیڑوں کی پیدائش رک جائے۔ نوٹ: "اکسیر کرم" انگریزی دوائیوں کے برعکس جانور پر کوئی برا اثر (Stress) نہیں ڈالتی بلکہ یہ جسم کو ایسی تقویت دیتی ہے جس کے باعث قدرتی طور پر کیڑے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کے معاون صحت بیکٹر یا وغیرہ نہیں مرتے۔

کھانسی اور برانکائٹس وغیرہ کیلئے

For Cough and Bronchitis

اکسیر کھانسی

سانس کی نالی کی سوزش اور نظام تنفس میں کسی جگہ خراش (Irritation) اور انفیکشن یا پھیپھڑوں کے پیراسائٹس وغیرہ کے باعث جانوروں میں کھانسی کی علامت پیدا ہوتی ہے۔ خوراک یا کسی چیز کا سانس کی نالی میں چلے جانا، اگر دغبار اور جراثیم وغیرہ کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق جانور کو "اکسیر کھانسی" چار، چھ یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

گرمی کے اثر اور لو لگنے کیلئے

For Heat Stroke and Heat Exhaustion etc.

اکسیر گرمی

گرم موسم، دھوپ، پانی کی کمی اور سخت محنت مشقت سے جانور کے جسم میں زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم سے حرارت کے اخراج کا نظام سست پڑ جاتا ہے۔ جانور تیز تیز سانس لیتا ہے ہانپتا ہے اور خوراک کم کھاتا ہے جس سے جانور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق "اکسیر گرمی" حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ جانور کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ میں باندھیں، نہلائیں، زیادہ پانی پلائیں اور جانور سے کام نہ لیں۔ (گرم موسم میں جانوروں کو بطور حفظ ماتقدم روزانہ ایک پیکٹ "اکسیر گرمی" دیں۔)

بدمزاج ضدی اور غصیلے جانوروں کیلئے

For ill tempered animals

اکسیر مزاج

بعض جانور دودھ دوہتے وقت تنگ کرتے اور کودتے ہیں یا آسانی سے دودھ نہیں اتارتے۔ بعض بیل اور گھوڑے وغیرہ مارتے، اثری کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا بچہ مر جائے تو غم اور غصے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر مزاج" صبح و شام ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ جن جانوروں کو سدھایا جائے (کرا) حار ماہوں کیلئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔ (نیز دیکھیں ”اکسیر ملک فیور، اکسیر پرسوت، اکسیر سرن“)
 بیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy for Intestinal Worms & Liver Fluke.

اکسیر کرم

گنداپانی پینے، مٹی چاٹنے اور متاثرہ چارہ کھانے سے مختلف کیڑوں کے انڈے اور لاروے جانور کے جسم میں جا کر پرورش پاتے ہیں۔ ان کیڑوں میں معدے اور آنتوں کے ورمر اور لیور فلوک (جگر کی جونکیں) وغیرہ شامل ہیں جو جانور کو کمزور کر کے اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات نچلے جڑے کے نیچے غدود بھی سوج جاتے ہیں جسے لوگ غلطی سے گلہڑ کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو ”اکسیر کرم“ صبح و شام صرف ایک دن پلا دیں خوراک کی دہرائی ایک ماہ کے بعد پھر کریں۔ تاکہ آئندہ بھی کیڑوں کی پیدائش رک جائے۔ نوٹ: ”اکسیر کرم“ انگریزی دوائیوں کے برعکس جانور پر کوئی برا اثر (Stress) نہیں ڈالتی بلکہ یہ جسم کو ایسی تقویت دیتی ہے جس کے باعث قدرتی طور پر کیڑے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کے معاون صحت بیکٹر یا وغیرہ نہیں مرتے۔

کھانسی اور برانکائٹس وغیرہ کیلئے
 For Cough and Bronchitis

اکسیر کھانسی

سانس کی نالی کی سوزش اور نظام تنفس میں کسی جگہ خراش (Irritation) اور انفیکشن یا پھیپھڑوں کے پیراسائٹس وغیرہ کے باعث جانوروں میں کھانسی کی علامت پیدا ہوتی ہے۔ خوراک یا کسی چیز کا سانس کی نالی میں چلے جانا، اگر گردوغبار اور جراثیم وغیرہ کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق جانور کو ”اکسیر کھانسی“ چار، چھ یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

گرمی کے اثر اور لو لگنے کیلئے
 For Heat Stroke and Heat Exhaustion etc.

اکسیر گرمی

گرم موسم، دھوپ، پانی کی کمی اور سخت محنت مشقت سے جانور کے جسم میں زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم سے حرارت کے اخراج کا نظام سست پڑ جاتا ہے۔ جانور تیز تیز سانس لیتا ہے ہانپتا ہے اور خوراک کم کھاتا ہے جس سے جانور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق ”اکسیر گرمی“ حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ جانور کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ میں باندھیں، نہلائیں، زیادہ پانی پلائیں اور جانور سے کام نہ لیں۔ (گرم موسم میں جانوروں کو بطور حفظ ما تقدم روزانہ ایک پیکٹ ”اکسیر گرمی“ دیں۔)

بدمزاج ضدی اور غصیلے جانوروں کیلئے

For ill tempered animals

اکسیر مزاج

بعض جانور دودھ دوھتے وقت تنگ کرتے اور کودتے ہیں یا آسانی سے دودھ نہیں اتارتے۔ بعض بیل اور گھوڑے وغیرہ مارتے، اڑی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا بچہ مر جائے تو غم اور غصے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے جانور کو ”اکسیر مزاج“ صبح و شام ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ جن جانوروں کو سدھایا (ٹرینڈ کیا) جا رہا ہو ان کیلئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

اکسیر نمونیہ وز کام

ٹھنڈ (سردی) لگنے اور نمونیہ وغیرہ کیلئے
For Pneumonia and Colds etc.

سرد موسم، بھگینے، ٹھنڈے پانی اور تیز بستہ چارہ وغیرہ سے زکام بخار اور نمونیہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے "اکسیر نمونیہ وز کام" کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ جانور کو گرم جگہ باندھیں اور اچھی خوراک دیں۔ (نیز دیکھیں اکسیر ٹنگ کپسولز)

(G) گھوڑوں کی امراض کے لئے ادویات

TREATMENT OF THE DISEASES OF HORSES

آب گیر

آب گیر یا چھاتی بند کیلئے

For Laminitis

یہ مرض گھوڑوں کا ہے لیکن کبھی کبھار مویشی اور بھیڑیں بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کی وجہ پاؤں میں چوٹ اور انفیکشن کے علاوہ نظام ہضم کی انفیکشن ہے جو طاقتور غذا مثلاً سبز چنے، جئی اور دانے وغیرہ کھلانے اور جانور سے کام نہ لینے کے باعث ہوتی ہے جس سے پاؤں کی لیمینا جھلی میں اجتماع خون ہو کر سوزش اور انفیکشن ہو جاتی ہے۔ جانور درد محسوس کرتا اور لنگڑاتا ہے ٹمپر پچر بڑھ جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر آب گیر" تکلیف کی شدت کے مطابق دن میں دو، چار مرتبہ ایک ایک پیکٹ دیں۔ اگر پاؤں پر کوئی ظاہری زخم ہو تو اسے صاف رکھیں اور "کیوریٹو آئل" لگائیں جانور کو نرم جگہ پر باندھیں اور آرام آنے تک کام نہ لیں۔

اکسیر کنار (تنفس)

کنار نظام تنفس کی انفیکشن
Respiratory Infections, Catarrh, Strangles, Bronchitis etc.

کنار گھوڑے، گدھے اور خچر کے علاوہ دوسرے جانوروں کو بھی سردی لگنے، بھگینے، گرم حالت میں ٹھنڈا پانی پینے سرد ہونے اور چھنوت کے ذریعہ انفیکشن سے ہو جاتا ہے جانور کھانتا ہے، ناک سے مواد بہتا ہے، کھانا کم کر دیتا ہے، ٹمپر پچر بڑھ جاتا ہے اور جڑے کے نیچے غدود سوج جاتے ہیں ایسے جانور کو "اکسیر کنار" مرض کی شدت کے مطابق چار، بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ پیکٹس کافی ہیں جانور کو گرم، روشن اور ہوادار جگہ پر رکھیں اور سردی سے بچائیں۔ (نیز دیکھیں اکسیر نمونیہ وز کام، اکسیر ٹنگ کپسولز)

گھوڑوں وغیرہ میں ہڈا اور بیرھڈی وغیرہ کیلئے
For Exostosis i.e. Bony Enlargement

اکسیر ہڈا

یہ مرض عموماً زیادہ کام کرنے والے گھوڑوں میں ہوتا ہے۔ پنڈلی یا گھٹنوں وغیرہ ہڈی کے اوپر زائد ہڈی بن جاتی ہے جو بدنما معلوم ہوتی ہے اور گھوڑا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مرض کا جتنی جلدی علاج کیا جائے اتنا ہی مؤثر ہے "اکسیر ہڈا" روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔

جانوروں کی بہتر صحت اور دیکھ بھال کیلئے ہدایات

TREATMENT FOR DISEASES OF UDDERS AND TEATS

Food

خوراک

ہر جانور کو اس کے کام اور صلاحیت کے مطابق متوازن خوراک دینی چاہیے۔ جانور کو خوراک کم دینے سے اس کی صحت گر جاتی ہے اور زیادہ کھلانے سے وہ موٹا ہو جاتا ہے اس لئے بیکار ہو جاتا ہے اور چارہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے جانور کا راشن مقدار میں اور غذائیت کے لحاظ سے مناسب نسبت کا ہونا چاہیے جس سے جانور کا وزن قد اور دودھ بڑھے گا۔ جانور میں طاقت بڑھے گی اچھا کام دے گا بیمار یوں کا مقابلہ کرے گا اور سردی، گرمی برداشت کرے گا۔

راشن میں جو اناج دیئے جانے چائیں وہ بالکل صاف ستھرے تندرست اور غذائیت سے بھرپور ہونے چاہیں۔ پرانے، کیڑا لگے یا آلی (Fungs) لگے نہیں ہونے چاہیں چارہ تازہ مگر شبنم سے پاک ہونا چاہیے۔ باسی یا گلا سٹرا چارہ جانور کی صحت کیلئے نقصان دہ ہے۔ جانور کی خوراک اور چارے میں یکدم تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اس سے دودھ کی پیداوار میں فرق پڑ جاتا ہے۔

کھلی، بنولے، سرسوں، تل، تارا میرا، توریا کی کھلی دودھار گائے بھینس کو کھلانے کے کام آتی ہے۔ ان سے قبض رفع ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ تیل کی مقدار باقی ہوتی ہے۔ اور جسم میں ہیٹ اور انرجی پیدا ہوتی ہے تارا میرا کی کھلی اضلاع جہلم، کیمپلور، میانوالی، میں دیتے ہیں اس سے خارش کا کم خطرہ ہوتا ہے بیج مائٹ ہلاک ہو جاتے ہیں۔

بنولا :- مکھن کی پیدائش بڑھانے کیلئے بنولا دیا جاتا ہے۔ بنولا گرم پانی میں چار گھنٹے بھگو کر دینے چاہیں کیونکہ ان کا چھلکا سخت ہوتا ہے گائے بھینس کو بچہ دینے کے بعد چالیس دن تک بنولا نہیں دینے چاہیں کیونکہ ان سے دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے اور دودھ کے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ چالیس دن تک دودھ بڑھ چکتا ہے پھر بے شک دے دیں۔ یاد رہے کہ ایک آدھ چھٹانک نمک ہر جانور کو روزانہ ملنا چاہیے یا اتنی مقدار ان کے راشن میں ڈالنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نمک کا ڈالا ان کی کھری میں رکھ دینا چاہیے یا تار میں پرو کر کسی شہتیر سے لٹکا دینا چاہیے تاکہ جانور حسب ضرورت چائتا رہے اور اس کو مٹی کھانے کی عادت نہ پڑے اگر جانور نمک نہ چائے تو نمک کے ڈلے کو پانی سے گیل کر کے اس پر تھوڑا سا آنا ڈال دینا چاہیے تاکہ آنا کے لالچ سے نمک کے ڈلا کو چائے چند روز ایسا کرنے سے جانور نمک چاٹنے کا عادی ہو جائے گا۔

وٹامن :- وٹامن کی کمی سے جانوروں کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہتی ہے وٹامن سبز چارے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ گاجر، وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ حاملہ گائے بھینسوں کو ان کا دینا ضروری ہے اگر حاملہ جانوروں کو بڑا چارہ نہ ملے تو ان کے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں اس کا تجربہ کونڈے کے ایک فارم میں ہوا ہے۔

گاجر :- گھوڑے کو ایک کلو گاجر روزانہ ملنی چاہیے خاص کر بارس سٹیلین کو۔ اس سے ان کے جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ گھوڑوں کی ملائی کیلئے تیار ہو جاتے ہیں گاجر لہائی کے رخ کاٹ کر دینی چاہیے گول گول پیسوں کی شکل میں نہ کاٹیں۔ چونک (گلے میں رکنے) کا خطرہ ہے۔ گھوڑا گاجر کو خوب چباتا ہے گھوڑے کا گاجر چبانا ضرب المثل ہے گرمی کے موسم میں ایک دو مٹھی ستوا ایک بالی پانی میں ڈال کر گھوڑے کو دیئے جائیں۔ گھوڑا پیئے گا اُس کو ٹھنڈک پہنچے گی اگر گرمی سے سرخ پیشاب آ رہا ہو گا تو صاف ہو جائے گا چونکہ اچھا صاف ستھرا مٹی کے بغیر ہو یہ قبض کشا ہے اس میں معدنی اجزاء بھی ہیں گھوڑے، مویشی دونوں کے لئے مفید ہے سردی کے موسم میں گھوڑوں کو ایک پاؤنڈ اسی کوفتہ گرم پانی میں بھگو کر دو چھٹانک شکر ڈال کر دی جائے ایک مہینہ تک دیں اس سے گھوڑے فربہ، توانا ہو جاتے ہیں ان کے بال چمکدار ہو جاتے ہیں ان میں لستر (Luster) پیدا ہوتی ہے۔ گھوڑے کو گندم کا دانہ نہیں دینا چاہیے اس کا جگر پر خراب اثر ہوتا ہے۔

پانی

Water

پانی جسم کا ایک اہم جزو ہے۔ دوران خون میں مدد دیتا ہے اوسطاً ایک بڑے جانور کو ایک وقت آٹھ دس گیلن پانی درکار ہوتا ہے۔ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے گند پانی جانور میں بد مزہ، صحت کی خرابی، پیٹ میں کیڑے پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا صاف پانی انسان پیتا ہے ویسا ہی جانور کو دینا چاہیے۔

رہائش

Residence

جانوروں کی رہائش کی جگہ کھلی ہونی چاہیے جہاں تازہ، ہوا مناسب دھوپ کا انتظام ہو۔ موسم کے لحاظ سے گرمی سردی اور بارش سے بچاؤ کا انتظام ہو صفائی کرنے کیلئے مناسب طریقہ کار اور آدمی مہیا ہو۔ جانوروں کے بٹھنے کی جگہ کچڑ اور گوبر سے پاک ہونی ضروری ہے تاکہ گندگی لگنے سے جانوروں کے تھنوں کو جراثیم اور بیکٹریا سے انفیکشن نہ ہو جائے۔ پانی اور چارہ کے برتن میں جانور پاؤں نہ ڈال سکیں۔ مویشی فارم کے اندر عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔

Preventive

حفاظتی تدابیر

بیمار جانور کا فوری علاج کروانا ضروری ہے۔ وباء کے دنوں میں حفاظتی ادویات جن کا رسالہ ہذا میں ذکر ہے۔ استعمال کروانے سے بفضلہ تعالیٰ جانور محفوظ رہیں گے۔

مثلاً 1- منہ کھر کی وباء میں بچاؤ کیلئے ”منہ کھر روک“ استعمال کروائیں۔

2- گل گھوٹ کی وباء میں بچاؤ کیلئے ”گل گھوٹ روک“ استعمال کروائیں۔

3- واہ کی دوا میں بچاؤ کیلئے "واہ روک" استعمال کروائیں۔

علاوہ ازیں بیماریوں کیلئے ضروری ادویات کا فارم میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بیماری کی صورت میں فوری علاج معالجہ ہو سکے۔

افزائش حیوانات

Veterinary Growth

حیوانات کی افزائش و بڑھوتری مالک کیلئے منافع کا باعث ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر مادہ جانوروں میں ہیٹ آنے کے بعد کے بیڑید کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور حاملہ کروالینا چاہیے۔ جس سے مالک کو وقت پر پھل حاصل ہوتا ہے اور دودھ بھی رواں ہو جاتا ہے۔ مختلف جانور اکٹھے رکھنے سے اُن کی آپس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے نیز چارہ میں بھی بچت ہو جاتی ہے۔ افزائش نسل میں کمی کی وجوہات میں مادہ کا جلد ہیٹ میں نہ آنا جیر کی رکاوٹ کی وجہ سے رحم کی خرابی، رحم کا باہر نکالنا، نفاس کا پورے طور پر خارج نہ ہونا ایسی امراض ہیں جن کا علاج وقت پر کروالیا جائے تو مادہ جانور آئندہ حاملہ ہونے کیلئے وقت پر ہیٹ میں آجائے گی۔ ورنہ جانور کا ہیٹ پریگنزر جائے گا اور مالک کو پھل حاصل نہیں ہوگا۔

مادہ جانور کے گرم ہونے یا ہیٹ میں آنے کی علامات

مادہ جانور بے چین ہوتی ہے بار بار پیشاب کرتی ہے پیشاب کے بعد لیسدار مادے کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے اوپر ٹاپتی ہے چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ دودھل جانور دودھ کم کر دیتے ہیں۔ مادہ جانور کا ہیٹ میں رہنے کا وقت اور اگر حاملہ نہ ہو سکے تو دوبارہ ہیٹ میں آنے کا وقت درج ذیل ہے۔

نام جانور	مدت ہیٹ	دوبارہ ہیٹ کا وقت	اوسط دن
گھوڑی	4 تا 9 دن	13 تا 25 دن	21 دن
گائے	10 تا 24 گھنٹے	18 تا 24 دن	21 دن
بھینس	12 تا 20 گھنٹے	18 تا 24 دن	21 دن
بھیڑ بکری	12 تا 24 گھنٹے	12 تا 19 دن	17 دن

حمل کا زمانہ

بھینس	10 ماہ
گدھی	11 ماہ
بھیڑ بکری	5 ماہ

گائے	9 ماہ
گھوڑی	11 ماہ
اونٹنی	12 ماہ

"CURATIVE" The Pioneer of Homoeopathic Combination

MORE THAN 50 MEDICINES FOR ANIMALS DISEASES.



CURATIVE VETERINARY (PVT). LTD.

HEAD OFFICE RABWAH PAKISTAN
 (3-8 DAVIS ROAD LAHORE) Tel: 0476005255 Fax: 047-6212299